

Aperçu

Composition du pavillon de l'oreille

Distribution globale des points de l'oreille

points de l'oreille : Hélix

points de l'oreille : gouttière de l'Hélix

points de l'oreille : branche supérieure & inférieure de l'Anthélix

points de l'oreille : Corps / Tronc de l'anthélix

points de l'oreille : Fossette triangulaire

points de l'oreille : Tragus

points de l'oreille : anti Tragus

points de l'oreille : Racine de l'hélix

points de l'oreille : petite conque ou hémi conque supérieure

points de l'oreille : grande conque ou hémi conque inférieure

points de l'oreille : lobule de l'oreille

points de l'oreille : Arrière du pavillon

Diagnostic différentiel Auriculaire

Composition du pavillon de l'oreille

Distribution globale des points de l'oreille

points de l'oreille : Hélix

points de l'oreille : gouttière de l'Hélix

points de l'oreille : branche supérieure & inférieure de l'Anthélix

points de l'oreille : Corps / Tronc de l'anthélix

points de l'oreille : Fossette triangulaire

points de l'oreille : Tragus

points de l'oreille : anti Tragus

points de l'oreille : Racine de l'hélix

points de l'oreille : petite conque ou hémi conque supérieure

points de l'oreille : grande conque ou hémi conque inférieure

points de l'oreille : lobule de l'oreille

points de l'oreille : Arrière du pavillon


Ce document est constitué à partir de compilation d'informations publiques, ne se substitue en aucune façon aux supports de formation officiels. Le Diffuseur ne pourrait être tenu responsable des erreurs qu'il pourrait contenir.

Le diffuseur ne pourrait être tenu pour responsable des conséquences qui pourraient provenir d'une mauvaise interprétation, compréhension, mal utilisation, des informations contenues dans ce document, il décline toute responsabilité légale quant aux éventuelles erreurs ou omissions, ainsi que pour tout hypothétique dommage qui pourrait être interprété comme étant la conséquence directe ou indirect des informations consignés dans ce document. Les personnes qui utilisent les contenus de ces documents le font sous leur entière responsabilité.

Ce document ne permet que de prendre connaissance avec différentes composantes de la Médecine Traditionnelle Chinoise.

Il n'a pas pour but d'éloigner les personnes de la médecine et des professionnels de santé. La consultation d'un praticien en Médecine Traditionnelle Chinoise ne saurait remplacer le suivi médical habituel ou en cours, ni se substituer aux traitements en cours. Seul votre médecin peut décider de l'arrêt ou de la modification d'un traitement médical.

Composition du pavillon de l'oreille




Composition du pavillon de l'oreille

Hélix	bord proéminent externe du pavillon de l'oreille
Tubercule de l'hélix	petit tubercule à la partie postéro-supérieure de l'hélix
Racine de l'hélix	crête transverse de l'hélix
Queue de l'hélix	partie inférieure de l'hélix, à la jonction de l'hélix et du lobule de l'oreille
Anthélix:	crête parallèle à l'hélix
- Tronc / corps de l'anthélix	en bas, partie verticale principale de l'anthélix
- Branche / racine supérieure de l'anthélix	en haut, séparation du corps de l'anthélix en 2 branches
- Branche / racine inférieure de l'anthélix	
Fossette triangulaire	dépression triangulaire entre les deux branches de l'anthélix
Gouttière de l'hélix	dépression recourbée située entre l'hélix et l'anthélix
Tragus	petite saillie triangulaire en avant de la cavité de l'oreille
Antitragus	petite saillie triangulaire au-dessus du lobule de l'oreille, en face du tragus
Echancrure / incisure sus-tragienne	dépression entre la racine de l'hélix et le bord supérieur du tragus
Echancrure / incisure intertragienne	dépression entre le tragus et l'antitragus
Echancrure entre anthélix et antitragus	dépression entre l'antitragus et l'anthélix
Lobule de l'oreille	partie la plus basse du pavillon dépourvue de cartilage
Conque de l'oreille:	dépression limitée par le tragus, l'antitragus, le tronc et la branche inférieure de l'anthélix
- Petite conque ou hémi conque supérieure	partie supérieure de la conque de l'oreille située au-dessus de la racine de l'hélix
- Grande conque ou hémi conque inférieure	partie inférieure de la conque de l'oreille située en dessous de la racine de l'hélix
Orifice externe du conduit auditif externe	orifice dans la conque de l'oreille protégé par le tragus
Racine auriculaire supérieure	zone où le bord supérieur du pavillon de l'oreille s'attache au cuir chevelu
Racine auriculaire inférieure.	zone où le bord inférieur du pavillon de l'oreille s'attache au cuir chevelu et au visage


Distribution globale des points de l'oreille

Zones du pavillon	Correspondances
Lobule de l'oreille	tête, visage
Antitragus	tête, cerveau
Tragus	gorge, nez interne
Corps de l'anthélix	tronc, rachis
Branche supérieure de l'anthélix	membres inférieurs
Branche inférieure de l'hélix	fesses
Gouttière de l'hélix	membres supérieurs
Fossette triangulaire	cavité pelvienne, organes génitaux internes
Racine de l'hélix	diaphragme
Hémiconque supérieure	cavité abdominale
Hémiconque inférieure	cavité thoracique




points de l'oreille : Hélix

Appellation	Localisation	Indications
* Centre de l'oreille (ER ZHONG) ou Diaphragme (GE)	sur la racine de l'hélix	maladies du système digestif, jaunisse,
		hoquet, maladies de peau, urticaire,
		prurit cutané, énurésie infantile,
		hémoptysie
Rectum (ZHI CHANG)	à l'extrémité de l'hélix, près de l'échancrure sus-tragienne, au niveau du point G.I.	constipation, prolapsus anal, ténésme, hémorroïde
Urètre (NIAO DAO)	au niveau du bord inférieur de la branche inférieure de l'anthélix, au-dessus du point Rectum, au niveau du point Vessie	énurésie, pollakiurie, miction
		pressante, miction douloureuse, rétention d'urine
Organes génitaux externes (WAI SHEN ZHI QI)	au niveau du bord supérieur de la branche inférieure de l'anthélix, au-dessus du point Urètre	orchite, épидидymite, vaginite, impuissance, prurit vulvaire, prurit scrotal
Anus (GANG MEN)	bord antérieur de la branche supérieure de l'anthélix	hémorroïdes, fissure anale
* Apex de l'oreille (ER JIAN)	au sommet du pavillon quand l'oreille est pliée vers le tragus	maladies oculaires, conjonctivite aiguë, orgelet, fièvre, HTA
YANG du Foie (GAN YANG)	sur le tubercule de l'hélix	vertiges, céphalée, HTA
Hélix 1, 2, 3, 4, 5 et 6 (LUN 1, 2, 3, 4, 5, 6)	zone entre le bord inférieur du tubercule auriculaire (hélix 1) et le milieu du bord inférieur du lobule de l'oreille (hélix 6), divisée en 5 portions égales	fièvre, infection du système respiratoire supérieur, amygdalite




points de l'oreille : gouttière de l'Hélix

Appellation	Localisation	Indications
Doigt (ZHI)	au sommet de la gouttière de l'hélix	douleur et engourdissement des doigts, périonyxis
Poignet (WAN)	au niveau de la proéminence du tubercule de l'hélix, entre les points Coude et Doigt	douleur du poignet
Ruisseau de vent (FENG XI) ou Urticaire (QIAN MA ZHEN) ou Allergie (GUO MIN)	entre le point Doigt et le point Poignet	maladies allergiques, urticaire, prurit, cutané, rhinite allergique, asthme
Coude (ZHOU)	entre le point Poignet et le point Epaule	tennis-elbow, épicondylite, douleur du coude
Epaule (JIAN)	au niveau de l'échancrure sus-tragienne, entre les points Coude et Clavicule,	PSH, raideur de la nuque
Clavicule (SUO GU)	près de la queue de l'hélix, au niveau de l'échancrure entre l'antitragus et l'anthélix, un peu à l'extérieur de la queue de l'hélix	douleur à la clavicule, PSH
Articulation de l'épaule (JAN GUAN JIE)	entre le point Epaule et le point Clavicule	PSH



points de l'oreille : branche supérieure & inférieure de l'Anthélix


Appellation	Localisation	Indications
Orteils (ZHI)	Coin supéro-externe et postéro- supérieur de la branche supérieure de l'anthélix, près du point Apex de l'oreille	maladies des orteils, douleur aux orteils, périonyxis
Talon (GEN)	coin supéro-interne et antéro- supérieur de la branch1e supérieure de l'anthélix	douleur du talon
Cheville (HUI)	entre les points Talon et Genou	entorse, blessure et douleur de la cheville
Genou (XI)	sur le 1/3 médian de la branche supérieure de l'anthélix	entorse, blessure et douleur du genou, douleur et gonflement de la genou
Hanche (KUAN)	sur le 1/3 inférieur de la branche supérieure de l'anthélix	douleur à la hanche, sciatique



Appellation	Localisation	Indications
Fesses (TUN)	1/3 postérieur de la branche inférieure de l'anthélix	douleur des fesses, sciatique
* Ischion (ZUO GU) ou Nerf sciatique (ZUO GU SIEN JING)	2/3 antérieurs de la branche inférieure de l'anthélix	sciatique
* Extrémité de la branche inférieure de l'anthélix (XIA JIAO DUAN) ou Sympathique (JIAO GAN)	à l'extrémité de la branche inférieure de l'anthélix, à la jonction de la branche inférieure de l'anthélix et de l'hélix	douleur et spasme, angine de poitrine, palpitations, transpiration spontanée, spasme gastro-intestinal, colique biliaire, calcul dans l'uretère, dysfonctionnement du système nerveux végétatif


points de l'oreille : Corps / Tronc de l'anthélix

Appellation	Localisation	Indications
Abdomen (FU)	à la partie supérieure de l'anthélix, au niveau du bord inférieur de la branche inférieure de l'anthélix, en avant du point Vertèbres lombo sacrées près du bord de la conque inférieure	douleur et distension abdominales, diarrhée, dysménorrhée, entorse lombaire aigue
* Thorax (XEONG)	au niveau de l'échancrure sus-tragienne, au milieu de l'anthélix, au bord de la conque inférieure, en avant du point Vertèbres dorsales	douleur au thorax et aux hypocondres, plénitude thoracique, douleur costale, névralgie intercostale, mastite
Cou (JING)	au niveau de l'échancrure située à la jonction de l'anthélix et de l'antitragus, au bord de la conque inférieure, à la partie inférieure de l'anthélix, en avant du point Vertèbres cervicales	douleur, gonflement et raideur de la nuque, entorse du cou
Vertèbre (ZHUI)	sur la ligne courbe reliant l'échancrure séparant l'anthélix et l'antitragus de la bifurcation entre la branche supérieure et la branche inférieure de l'anthélix: 5 portions	douleur dans la zone correspondante
- Sacrées et Lombaires (YAO DI ZHUI)	- 2/5 supérieurs	douleur dans la région lombo-sacrée, douleur aux jambes, péritonite
- Dorsales (XIONG ZHUI)	- 2/5 médians	douleur thoracique, douleur aux hypocondres, syndrome prémenstruel, distension des seins, mastite, insuffisance de lactation
- Cervicales (JING ZHUI)	- 1/5 inférieur	raideur de la nuque, problèmes aux cervicales




points de l'oreille : Fossette triangulaire

Appellation	Localisation	Indications
* SHEN MEN de l'oreille (ER SHEN MEN)	au bord supérieur de la bifurcation des branches supérieure et inférieure de l'anthélix	calmer le SHEN, action sédatrice, action anti-inflammatoire, action antalgique, insomnie, nombreux rêves
* Organes génitaux internes (NEI SHENG ZHI QI) ou Utérus (ZI GONG) ou Palais du sperme (JING GONG) ou TIAN GUI	au 1/3 antérieur de la fossette triangulaire	maladies gynécologiques, règles irrégulières, leucorrhées, dysménorrhée, métrorragie, impuissance, émission nocturne, éjaculation précoce, prostatite
Fossette triangulaire médiane (JIAO WO ZHONG) ou Zone de l'Asthme (CHUAN DIAN)	au 1/3 médian de la fossette triangulaire	asthme
Cavité pelvienne (PEN QIANG)	au bord inférieur de la bifurcation des branches supérieure et inférieure de l'anthélix	inflammation pelvienne




points de l'oreille : Tragus

Appellation	Localisation	Indications
Nez externe (WAI BI) ou Faim (JI)	au centre de la face externe du tragus	obstruction nasale, furoncle nasal, rhinite, rhinite allergique, obésité simple
Gorge (YAN HOU)	1/2 supérieure de la face interne du tragus	pharyngite aiguë et chronique, laryngite, amygdalite, aphonie
Nez interne (NEI BI)	1/2 inférieure de la face interne du tragus	rhinite, rhume commun, rhinite, sinusite maxillaire, épistaxis
Apex sus-tragien (SHIANG PING JIAN) Apex du tragus (PING JIAN)	au sommet du tubercule supérieur du tragus	dentalgie, strabisme, fièvre, douleur
* Apex sous-tragien (XIA PING JIAN) ou Surrénales (SHEN SHANG XIAN)	au sommet du tubercule inférieur du tragus	hypotension, maladies allergiques, prurit, arthrite rhumatismale, oreillons, malaria, empoisonnement à la streptomycine, vertiges, hypoacousie




points de l'oreille : anti Tragus

Appellation	Localisation	Indications
* Bord médian (YUAN ZHONG) ou Cerveau (NAO)	au milieu de la ligne reliant le point PING CHUAN et l'échancrure entre l'antitragus et l'anthélix	énurésie, insomnie, métrorragie, maladie de Ménière, vertiges auriculaires
PING CHUAN (calmer la dyspnée) ou Apex de l'antitragus (DUI PING JJAN)	au sommet de l'antitragus	asthme, bronchite, oreillons, prurit cutané, orchite, épидидymite
* Sous-cortex (PI ZRI XIA) ou Cerveau (NAO)	sur la face interne de l'antitragus	action sédative, action antalgique, agitation, douleur, malaria, myopie, neurasthénie, insomnie, beaucoup de rêves, B.O. par déficience des Reins
Testicule (GAO WAN)	sur la face antéro- inférieure de l'antitragus, près du point Poumon	épididymite, hypogonadisme, troubles des règles, règles irrégulières
Front (E)	sur la zone antéro- inférieure de la face externe de l'antitragus	céphalée, vertiges, insomnie, beaucoup de rêves
Occiput (ZHEN)	sur la zone supéro- postérieure de la face externe de l'antitragus	céphalée, neurasthénie, vertiges, épilepsie, asthme
Tempe (NIE) ou TAI YANG	entre le point Front et le point Occiput, au milieu du bord externe de l'antitragus	céphalée, migraine, vertiges




points de l'oreille : Racine de l'hélix

Appellation	Localisation	Indications
Bouche (KOU)	près du bord postéro-supérieur de l'orifice du conduit auditif externe, au 1/3 antérieur sous la racine de l'hélix	paralysie faciale, ulcération de la bouche, stomatite, cholécystite, cholélithiase
Œsophage (SHI DAO)	dans la conque inférieure, au 1/3 médian sous la racine de l'hélix	dysphagie, œsophagite, spasme de l'œsophage, boule hystérique
Cardia (BEN MEN)	dans la conque inférieure, au 1/3 postérieur sous la racine de l'hélix	nausées, vomissements nerveux, spasme du cardia
Estomac (WEI)	là où la racine de l'hélix se termine	gastralgie, gastrite, spasme gastrique, ulcère gastrique, vomissements, dyspepsie, indigestion, insomnie, dentalgie
Duodénum (SHI ER ZHI CHANG)	dans la conque supérieure, au 1/3 postérieur du bord inférieur de la racine de l'hélix	ulcère duodénal, spasme du pylore, cholécystite, cholélithiase
I.G. (XIAO CHANG)	dans la conque supérieure, au 1/3 médian du bord supérieur de la racine de l'hélix	dyspepsie, indigestion, distension abdominale, palpitations, tachycardie, arythmie
G.I. (DA CHANG)	dans la conque supérieure, au 1/3 antérieur du bord supérieur de la racine de l'hélix	diarrhée, constipation, dysenterie, toux, acné
Appendice (LAN WEI)	dans la conque supérieure, entre le point I.G. et le point G.I	appendicite simple aiguë, diarrhée




points de l'oreille : petite conque ou héli-conque supérieure

Appellation	Localisation	Indications
Vessie (PANG GUANG)	au bord inférieur de la branche inférieure de l'anthélix, directement au-dessus du point G.I.	maladies de la vessie, énurésie, rétention urinaire, cystite, lombalgie, sciatique, céphalée occipitale
* Rein (SHEN)	au bord inférieur de la branche inférieure de l'anthélix, directement au-dessus du point I.G., en dessous de la zone de jonction de la branche inférieure et de la branche supérieure de l'anthélix	lombalgie, entorse lombaire, B.O., hypoacousie, vertiges, maladies gynécologiques, règles irrégulières, maladies urinaires, pyélonéphrite, énurésie, maladies de la reproduction, spermatorrhée, éjaculation précoce, neurasthénie, asthme
Uretère (SHU NIAO GUAN)	entre le point Reins et le point Vessie	maladies de l'urètre, calcul de l'urètre, avec douleur de colique
* Pancréas, V.B. (YI, DAN)		dyspepsie, gastralgie, pancréatite, maladies biliaires, cholécystite, cholélithiase, ascaridiase biliaire, diabète, migraine, zona, otite moyenne, B.O., hypoacousie
* Foie (GAN)	en arrière du point Estomac et du point Duodénum, sur la partie postéro-supérieure de la conque supérieure	maladies des yeux, myopie, glaucome, douleur aux hypocondres, vertiges, syndrome prémenstruel, troubles des règles, dysménorrhée, règles irrégulières, ménopause, HTA




points de l'oreille : grande conque ou héli conque inférieure

Appellation	Localisation	Indications
* Cœur (XIN)	au centre de la conque inférieure, dans la dépression centrale de la conque inférieure	hystérie, neurasthénie, insomnie, palpitations, arythmie, tachycardie, angine de poitrine, absence de pouls, ulcérations de la bouche et de la langue, stomatite
* Poumon (FEI)	zone en forme de U, en haut, en bas et en arrière du point Cœur, autour de la dépression centrale de la conque inférieure	rhume commun, toux, asthme, aphonie, oppression thoracique, plénitude thoracique, maladies cutanées, urticaire, acné, prurit cutané, verrue plane, constipation, simple obésité
* Rate (PI)	sous le point Foie, sur la partie postéro-supérieure de la conque inférieure	distension abdominale, diarrhée chronique, constipation, anorexie, dyspepsie, indigestion, troubles des règles, règles irrégulières, stagnation de l'énergie du Foie, métrorragie fonctionnelle, leucorrhée, maladie de Ménière, vertiges auriculaires
Trachée (QI GUAN)	entre l'orifice du conduit auditif externe et le point Cœur	toux, asthme
* Intertragus (DUI PING) ou Endocrines (NEI FEN MI)	au fond de la conque inférieure, à la partie inféro-postérieure de l'orifice du conduit auditif externe, à la partie inférieure de l'échancrure intertragiemie	troubles des règles, dysménorrhée, règles irrégulières, syndrome de la ménopause, troubles de la reproduction, impuissance, dermatose, acné, malaria, troubles endocriniens
* TR (SAN JIAO)	au fond de la conque inférieure, au dessus du point Endocrines ou Intertragus	constipation, distension abdominale, douleur sur le bord externe des membres supérieurs, œdème, obésité simple




points de l'oreille : lobule de l'oreille

Appellation	Localisation	Indications
Œil 1 (MU 1)	sur la partie antérieure du lobule, en bas et en avant de l'échancrure intertragienne	glaucome, myopie, orgelet
Œil 2 (MU 2)	sur la partie postérieure du lobe, en bas et en arrière de l'échancrure intertragierme	glaucome, myopie, orgelet, amétropie
Zone hypertensive (SHENG YA DIAN)	sur le bord inférieur de l'échancrure intertragienne	hypotension, collapsus
Dent 1 (YA 1)	au coin inféro-postérieur de la 1er zone du lobule de l'oreille et / ou au centre la le zone	dentalgie, périondite, anesthésie pour l'extraction des dents, hypotension
Langue (SHE)	sur la 2e zone du lobe	glossite, stomatite
Mâchoire (HE)	dans la 3e zone du lobule de l'oreille: - au centre (Mâchoire supérieure) - en haut (Mâchoire inférieure)	dentalgie, arthrite de l'articulation temporo-mandibulaire
Dent 2 (YA 2) ou Lobule antérieur (CHUI QIAN) ou Neurasthénie	au centre de la 4e zone du lobule de l'oreille	dentalgie, périondite, anesthésie pour l'extraction des dents, neurasthénie
* Œil (YAN)	au centre de la 5e zone du lobule de l'oreille	maladies des yeux, conjonctivite aiguë, ophtalmie électrique, glaucome, myopie, orgelet
Oreille interne (NEI ER)	au centre de la 6e zone du lobule de l'oreille	B.O., hypoacousie, vertiges auriculaire, maladie de Ménière
Joues (MIAN JIA)	à la jonction de la 5e et de la 6e zones du lobule de l'oreille	paralysie faciale périphérique, névralgie du trijumeau, acné, verrue plane
Amygdale (BIAN TIAO TI)	au centre de la 8e zone du lobule de l'oreille	amygdalite, pharyngite




points de l'oreille : Arrière du pavillon

Appellation	Localisation	Indications
* Sillon du dos de l'oreille (ER BEI GOU) ou Sillon hypotenseur (JIANG YA GOU)	dans le sillon de la branche inférieure de l'anthélix, sillon en Y formé par l'anthélix et ses 2 branches sur le dos du pavillon	HTA, prurit cutané
Racine du nerf vague auriculaire (EH MI GEN)	à la jonction de l'arrière de l'oreille et de la mastoïde, au niveau de la racine de l'hélix	céphalée, obstruction nasale, ascariase biliaire, cholécystite, cholélithiase, tachycardie, douleur abdominale, diarrhée
Racine supérieure de l'oreille (SHANG ER GEN)	bord supérieur de la racine du pavillon	douleur, paralysie, épistaxis
Racine inférieure de l'oreille (XIA ER GEN)	bord inférieur de la racine du pavillon	douleur, paralysie, hypotension
Cœur du dos de l'oreille (ER BEI XIN)	partie supérieure du dos du pavillon de l'oreille	palpitations, insomnie, beaucoup de rêves
Rate du dos de l'oreille (ER BEI PI)	centre du dos du pavillon de l'oreille, près de la terminaison de la racine de l'hélix	douleur gastrique, indigestion, anorexie
Foie du dos de l'oreille (ER BEI GAN)	à l'extérieur du point Rate	cholécystite, cholélithiase, douleur aux hypocondres
Poumon du dos de l'oreille (ER BEI FEI)	au bord interne du point Rate	toux, dyspnée, asthme, prurit cutané
Reins du dos de l'oreille	partie inférieure du dos du pavillon de l'oreille	vertiges, céphalée, neurasthénie



points de l'oreille : Hélix



points d'acuponcture du pavillon de l'oreille :

